

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Který z následně uvedených typů bolesti není uveden samostatně v jejich patofyziologické klasifikaci:

- a) periferní neuropatická
- b) nociceptorová (nocicepční/nociceptivní)
- c) viscerální
- d) psychogenní

2 Pro který typ bolesti se užívají k jejich popisu deskriptory: pálivá, palčivá, svědivá, vystřelující, pocit „elektrizování“?

- a) pro nociceptorovou (nocicepční/nociceptivní)
- b) pro psychogenní
- c) pro periferní neuropatickou
- d) nejsou typické pro žádný typ bolesti

3 Která z následujících možností neplatí pro chronickou bolest:

- a) rozvíjí se centrální senzitivace
- b) rozvíjí se sekundární hyperalgie
- c) rozvíjí se hypersenzitivita receptorů
- d) zvyšuje se práh bolesti

4 Výpočetní tomografie je založena na principu:

- a) měření absorpce kalcia v tkáni
- b) měření absorpce radiofrekvenčního vlnění v tkáni
- c) měření absorpce rtg záření v tkáni
- d) relaxometrie vodíkových protonů v tkáni

5 Nejčastější indikací pro výpočetní tomografii (CT) je:

- a) postižení míchy
- b) akutní krvácení
- c) postižení bílé hmoty míšň
- d) chronické krvácení do tkáně

6 Spirální vyšetření části těla výpočetní tomografií (CT):

- a) se provádí v přímých koronárních a sagitálních rovinách
- b) zahrnuje vyšetření v přímých 6 mm tenkých vrstvách
- c) umožňuje cílené vyšetření míchy
- d) se provádí tenkými řezy s rekonstrukcemi v různých rovinách

7 Riziko rozvoje AA:

- a) je 5násobně vyšší u kuřáků než u nekuřáků
- b) je 3násobně vyšší u kuřáků a nekuřáků
- c) se signifikantně nezvyšuje s počtem let aktivního kouření
- d) je u kuřáků malé

8 Asymptomatické AA je indikováno k chirurgické, resp. EVL:

- a) pokud je největší průměr AA 5,5 cm a více
- b) pokud je největší průměr AA 5 cm a více
- c) pokud je nárůst velikost AA 0,5 cm za rok
- d) k chirurgické, resp. EVL jsou indikována jen symptomatická AA

9 Mezi rizikové faktory vzniku AA nepatří:

- a) kouření
- b) věk
- c) obezita
- d) hypertenze

10 Čo je najčastejšou príčinou periorálnej dermatitidy?

- a) seborea
- b) dlhodobá aplikácia lokálnych kortikosteroidov
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) psoriasis

11 Výskyt periorálnej dermatitidy je najčastejší:

- a) u mladých žien vo veku 20–45 rokov
- b) u dievčat a chlapcov v puberte
- c) v dojčenskom veku
- d) u mladých mužov

12 Jaká je doporučená optimální hladina glykovaného hemoglobinu?

- a) větší než 6 %
- b) menší než 6 %
- c) větší než 4,5 %
- d) menší než 4,5 %

Odpovědi: 1. c; 2. c; 3. d; 4. c; 5. b; 6. d; 7. a; 8. a; 9. c; 10. b; 11. a; 12. d