

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Léčbu warfarinem před operačním výkonem překlenujeme LMWH:

- a) při akutní tromboembolické nemoci
- b) při operaci katarakty
- c) při náhradě mechanické chlopně
- d) u každého pacienta

2 K nízkému operačnímu riziku patří:

- a) maligní onemocnění
- b) drobné kožní výkony
- c) trombofilie
- d) operace v malé pánvi (urolog. + gynekol.), déle trvající, starší pacienti

3 U periferní hypotyreózy:

- a) je TSH snížený a FT4 snížený
- b) je TSH zvýšený a FT4 normální nebo snížený
- c) je FT4 snížený a TSH normální
- d) je TSH zvýšený a FT4 zvýšený

4 Gravesova-Basedowova nemoc:

- a) je nejčastější příčinou hypertyreózy u osob nad 80 let
- b) je příčinou hypotyreózy
- c) může být provázena endokrinní orbitopatií
- d) je vždy indikací k operaci štítné žlázy

5 Při léčbě hypotyreózy:

- a) se dávka levotyroxinu v graviditě obvykle snižuje
- b) se tablety užívají vždy po jídle
- c) jsou cílové hodnoty TSH 1–2 mIU/l
- d) jsou nutné doživotní kontroly TSH 1x za 3 měsíce

6 Pacienti s nádorovým onemocněním a váhovým úbytkem:

- a) mají lepší prognózu než dobře živí
- b) podvýživa je marker závažnosti choroby a špatné prognózy
- c) nutriční hodnocení neprovádíme
- d) nutriční intervence se poskytuje až těžce kachektickým pacientům

7 SIT lze použít v léčbě:

- a) alergické rinitidy a bronchiálního astmatu
- b) potravinové alergie
- c) chronické urtikarie
- d) alergie na jed včely

8 Pro úspěšnost léčby SIT je podstatné:

- a) doba aplikace 3 měsíce
- b) složení přípravku pro SIT obsahuje většinu alergenů, na které byla u pacienta zjištěna přecitlivělost
- c) doba aplikace 3–5 let
- d) složení přípravku pro SIT, jež obsahuje jeden nebo málo hlavních senzibilizujících alergenů, jež přímo vyvolávají potíže u nemocného

9 Při provádění SIT:

- a) je možný výskyt systémové alergické reakce
- b) současné podávání betablokátorů omezuje účinek adrenalinu jako léku volby pro léčbu anafylaktické reakce
- c) injekční formu SIT může aplikovat každý lékař
- d) je nutno aplikaci zastavit, pokud pacient dostal živou očkovací látku

10 Anti-dsDNA protilátky u pacientů se SLE mají souvislost:

- a) s postižením myokardu
- b) s kožním postižením
- c) s postižením ledvin
- d) s přítomností antifosfolipidového syndromu

11 Nejčastější formou postižení plic u pacientů se SLE je:

- a) plicní hypertenze
- b) plicní embolizace
- c) intersticiální plicní fibróza
- d) pleuritida

12 Interval převazu ovlivňuje:

- a) množství sekrece
- b) typ krytí
- c) lokalita rány
- d) rozhodnutí pacienta

Odpovědi: 1. a, c; 2. b; 3. b; 4. c; 5. c; 6. b; 7. a; 8. c; 9. a, b; 10. c; 11. d; 12. a, b, c