

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Z čeho se skládá sluchadlo?

- a) mikrofon, zesilovač
- b) zesilovač, reproduktor
- c) mikrofon
- d) mikrofon, reproduktor, zesilovač

2 Příspěvky ke sluchadlům od pojišťovny pro dospělé rozdělujeme do tří skupin:

- a) ztráty sluchu
- b) dle věku
- c) dle ztráty sluchu a věku
- d) dle pohlaví

3 Ušní tvarovky rozdělujeme dle tvaru na:

- a) slupka, zátka, prstýnek
- b) slupka, zátka, prsten, kovadlinka
- c) slupka, třmen, zátka, prsten
- d) prsten, slupka

4 Původce LB se přenáší:

- a) vzduchem
- b) pomocí vektoru, kterým je převážně klíště
- c) především hmyzem
- d) všemi uvedenými způsoby

5 LB se diagnostikuje na základě:

- a) laboratorních nálezů
- b) klinického obrazu a laboratorních nálezů
- c) některé formy pouze na základě klinického obrazu
- d) opakovaně prováděných sérologických vyšetření

6 ATB léčba u LB:

- a) je zahajována vždy při pozitivě laboratorních nálezů
- b) není indikována u dětí do 5 let a gravidních žen
- c) její délka se řídí subjektivní stesky u pacienta
- d) je indikována vždy při EM

7 Efekt léčby LB se posuzuje:

- a) podle poklesu protilátkové odpovědi bezprostředně po léčbě
- b) podle sérokonverze z positivity do negativity po léčbě
- c) podle klinického efektu léčby
- d) podle hodnocení laboratoře

8 Pro dráždivý tračník svědčí:

- a) úbytek na váze
- b) malá návštěvnost ordinace praktického lékaře
- c) bezpříznaková období
- d) změna ve vyprazdňování stolice

9 Ve farmakologické léčbě zácpové formy dráždivého tračníku se osvědčují:

- a) laktulóza
- b) spasmolytika
- c) tricyklická anidepresiva
- d) prokinetika

10 Hlavním cílem léčby astmatu je:

- a) dosažení kontroly nad astmatem
- b) dosažení, co nejmenší tíže astmatu
- c) astma bez exacerbací
- d) snížení mortality na astma

11 Lékem první volby farmakoterapie perzistujícího astmatu jsou:

- a) inhalační kortikosteroidy s výjimkou pacientů v dětském věku
- b) inhalační kortikosteroidy s výjimkou pacientů v seniorském věku
- c) inhalační kortikosteroidy
- d) antileukotrieny

12 Při exacerbaci astmatu jsou lékem první volby:

- a) theofyliny i.v.
- b) theofyliny p.o.
- c) systémové kortikosteroidy
- d) inhalační beta2-agonisté s rychlým nástupem účinku (RABA)

Správné odpovědi: 1. d; 2. a; 3. c; 4. b; 5. b, c; 6. d; 7. c; 8. c, d; 9. a; 10. a; 11. c; 12. d