

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Co řadíme mezi omezovací prostředky?

- a) umístění pacienta v ochranném (sítovém) lůžku, umístění pacienta v izolační místnosti, fyzické omezení pacienta v pohybu (ochranné pásy), připoutání nemocného k lůžku, užití ochranných prostředků (ochranný kabátek) a parenterální podání psychofarmak bez souhlasu nemocného
- b) pobyt pacienta na uzavřeném oddělení bez souhlasu nemocného, umístění pacienta v ochranném (sítovém) lůžku, umístění pacienta v izolační místnosti, fyzické omezení pacienta v pohybu (ochranné pásy), připoutání nemocného k lůžku, užití ochranných prostředků (ochranný kabátek) a parenterální podání psychofarmak bez souhlasu nemocného
- c) pobyt pacienta na uzavřeném oddělení bez souhlasu nemocného, umístění pacienta v ochranném (sítovém) lůžku, fyzické omezení pacienta v pohybu (ochranné pásy), připoutání nemocného k lůžku, užití ochranných prostředků (ochranný kabátek) a parenterální podání psychofarmak bez souhlasu nemocného
- d) umístění pacienta v ochranném (sítovém) lůžku, umístění pacienta v izolační místnosti, fyzické omezení pacienta v pohybu (ochranné pásy), připoutání nemocného k lůžku a užití ochranných prostředků (ochranný kabátek)

2 Kdo rozhoduje o užití omezovacího prostředku?

- a) o užití omezovacího prostředku rozhoduje lékař nebo jiný zdravotnický pracovník k tomu způsobilý dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
- b) o užití omezovacího prostředku rozhoduje výhradně lékař
- c) o užití omezovacího prostředku rozhoduje lékař, jiný zdravotnický pracovník k tomu způsobilý dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýkoli zdravotnický pracovník ve službě přítomný neklidu či agresivitě a o užití restrikce ihned informuje lékaře
- d) o užití omezovacího prostředku rozhoduje zdravotnický pracovník k tomu způsobilý dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a užití restrikce ihned informuje lékaře

3 Jaký právní dokument upravuje užívání restriktivních opatření v ČR?

- a) vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
- b) příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění a vyhláška č. 166/2007 Sb., které doporučují konkrétní obsah standardů péče
- c) věstník MZ č. 5 částka 7/2009 o Používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních České republiky
- d) standard ošetřovatelské péče o omezování pacientů v lůžku

4 Jaký význam má vyšetření D dimeru při suspekci na HŽT:

- a) zvýšená hodnota D dimeru jasně potvrzuje HŽT
- b) normální hodnoty D dimeru jasně vylučují HŽT
- c) D dimery mají negativní prediktivní význam (normální hodnota D dimeru znamená malou pravděpodobnost HŽT, zvýšená hodnota může být přítomna i u jiných onemocnění a vyžaduje další diagnostiku)
- d) podle hodnoty D dimeru lze usuzovat na závažnost HŽT

5 Kdy ukončit antikoagulační léčbu u pacientky s 1. atakou HŽT bérce bez plicní embolie?

- a) po sonografické kontrole po 3 měsících účinné antikoagulační léčby
- b) po 3 měsících
- c) po ústupu otoku
- d) ponechat trvalou antikoagulační léčbu

6 Genetické vyšetření trombofilních stavů je indikováno:

- a) u všech osob s HŽT
- b) u mladých osob s idiopatickou HŽT a pozitivní rodinnou anamnézou nebo s recidivujícími atakami idiopatické HŽT
- c) u osob s masivní plicní embolií
- d) u osob s HŽT nebo TEN v rodinné anamnéze

7 Které z uvedených antidiabetik jsou váhově neutrální?

- a) inzulin
- b) glibenklamid
- c) sitagliptin
- d) pioglitazon

8 Lékem 1. volby u diabetu 2. typu je:

- a) derivát sulfonylurey
- b) inzulin
- c) glitazon
- d) metformin

9 Riziko hypoglykemie je při léčbě:

- a) metforminem
- b) liraglutidem
- c) glimepiridem
- d) inzulinem

10 Nejčastějším vyvolavatelem onychomykóz je:

- a) *Trichophyton mentagrophytes*
- b) *Trichophyton rubrum*
- c) *Candida albicans*
- d) *Microsporum canis*

11 Mezi allylaminová antimykotika patří:

- a) Ketokonazol
- b) Itrakonazol
- c) Terbinafin
- d) Nystatin

12 Lanosterol demetylázu inhibuje:

- a) Fungicidin
- b) Itrakonazol
- c) Terbinafin
- d) Nystatin

13 Nejčastější klinickou formou onychomykózy je:

- a) distálnělaterální subunguální onychomykóza
- b) proximální subunguální onychomykóza
- c) totální dystrofická onychomykóza
- d) superficiální bílá onychomykóza

14 Mezi acidopeptická onemocnění nepatří

- a) gastropatie z nesteroidních antiflogistik
- b) refluxní choroba jícnu
- c) funkční gastropatie (dráždivý žaludek)
- d) bulbitida

15 Dominující příznak refluxní choroby jícnu je:

- a) odynofagie
- b) dysfagie
- c) horní dyspepsie
- d) pyróza

16 Nejrychlejší úlevu při refluxních obtížích obvykle přinese:

- a) antacidum
- b) antagonist H₂ receptorů
- c) inhibitor protonové pumpy
- d) doušek slivovice

17 Gastrinom je výraz pro:

- a) Heřmanského-Pudlákův syndrom
- b) Zollingerův-Ellisonův syndrom
- c) Mendelsohnův syndrom
- d) Dumping syndrom

18 Cílový TK u nemocných s hypertenzí a ICHS by neměl klesnout pod:

- a) pod 120/80 mm Hg
- b) pod 150/95 mm Hg
- c) pod 130–140/90–85 mm Hg
- d) pod 160/90 mm Hg

19 Které antihypertenzní léky u ICHS nejsou vhodné?

- a) inhibitory ACEi
- b) betablokátory
- c) blokátory vápníkových kanálů
- d) alfablokátory

20 Erytropoetin jako růstový faktor pro červené krvinky je produkován:

- a) ledvinami
- b) játry
- c) převážně ledvinami, částečně pak játry a mozkem
- d) všechny odpovědi jsou správně

Správné odpovědi: 1. b, 2. a, 3. c, 4. c, 5. a, 6. b, 7. c, 8. d, 9. c, d, 10. b, 11. c, 12. b, 13. a, 14. c, 15. d, 16. a, 17. b, 18. c, 19. d, 20. d