


Egis a kombinační léčba hypertenze

Med. praxi 2015; 12(3): 146

Obrázek 1. Bigital – účinné snížení TK



82,5% pacientů dosáhlo cíle studie (TK < 140/90 mmHg)


Společnost Egis se zabývá prodejem generických přípravků, ale má i vlastní vývoj léků s celou řadou inovací. Tyto přípravky postupně uvádí na trh a snaží se vycházet vstříc potřebám po kvalitních, účinných a dostupných léčivech.

I v letošním roce společnost Egis představila své kardiologické portfolio na Výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který se konal tradičně v Brně, a to ve dnech 24.–27. května 2015 (obrázek 4).

Společnost představila nový antihipertenzní přípravek **Bigital**, fixní kombinaci účinných látek bisoprololu a amlodipinu. Tato kombinace beta-blokátoru (snížení srdečního výdeje) a blokátoru kalciového kanálu (snížení periferní rezistence) umožňuje zvýšit antihipertenzní a antianginózní účinek. Z této kombinace mohou profitovat především pacienti hypertonici s manifestací ICHS a/nebo chronickým srdečním selháním, případně významnou dysfunkcí levé komory srdeční. Podle posledních evropských doporučení (ESH/ESC 2013 GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION) by mělo být měření krevního tlaku vždy spojeno s měřením tepové frekvence, protože klidové hodnoty tepové frekvence mohou být za určitých stavů, včetně hypertenze, nezávislým prediktorem KV onemocnění nebo fatální příhody. Proto by měl být Bigital předepisován i hypertonikům s vyšší tepovou frekvencí (obrázek 1 a 2).


Další fixní kombinací společnosti Egis pro léčbu hypertenze je lék **Egiramlon**, kombinace účinných látek ramiprilu (ACE inhibitor) a amlodipinu (blokátor kalciového kanálu). Díky této fixní kombinaci lze dosáhnout účinnějšího snížení TK než při monoterapii amlodipinem (obrázek 3).

Obrázek 2. Bigital – účinné snížení tepové frekvence



Rana R, Patil A. Efficacy and Safety of Bisoprolol plus Amlodipine Fixed Dose Combination in Essential Hypertension. Indian Practitioner. 2008; 61(4): 225–234.

Obrázek 3. Egiramlon – účinné snížení TK



Miranda RD, Mion D, Rocha JC, et al. 2008. An 18-Week, Prospective, Randomized, Double-Blind, Multicenter Study of Amlodipine/Ramipril Combination Versus Amlodipine Monotherapy in the Treatment of Hypertension: The Assessment of Combination Therapy of Amlodipine/Ramipril (ATAR) Study. Clinical Therapeutics, 30: 1618–1628.
3. Taylor AA, Shoheiber O. 2003. Adherence to antihypertensive therapy with fixed-dose amlodipine besylate/benazepril HCl versus comparable component-based therapy. Congest Heart Fail, 9: 324–332.

Obrázek 4. Egis – prezentace na Výročním sjezdu ČKS

