

1 Menší nárůst tělesné hmotnosti v porovnání s ostatními SU-PAD byl zaznamenán při terapii:

- a) gliklazidem
- b) glimepiridem
- c) gliquidonem
- d) glipizidem

2 Gliptiny:

- a) působí irreverzibilní blokádu DPP-IV
- b) jsou aplikovány injekčně
- c) snižují tělesnou hmotnost
- d) zvyšují tvorbu inzulínu pouze při hyperglykemii

3 Deriváty meglitinidu:

- a) se podávají běžně jedenkrát denně
- b) nahrazují v terapii SU-PAD, pokud došlo k sekundárnímu selhání
- c) jsou vhodná u pacientů s významným vzestupem PPG
- d) mají vyšší riziko hypoglykemií v porovnání s SU-PAD

4 Laboratorním nálezem při alkoholovém poškození jater je:

- a) vyšší hodnota ALP
- b) vyšší hodnota GGT
- c) poměr ALT/AST větší než 1
- d) mikrocytární anémie

5 Steatóza jater při abúzu alkoholu:

- a) se nachází u více než poloviny pacientů s nadměrným abúzem alkoholu
- b) není reverzibilní
- c) se histologicky neliší od steatózy při nealkoholové jaterní chorobě
- d) není provázena hepatomegalií

6 Mezi zásadní léčebná opatření při alkoholovém jaterním poškození patří:

- a) podávání „hepatoprotektivních“ léků
- b) absolutní abstinence
- c) dostatečný a vyvážený kalorický příjem
- d) snížení příjmu bílkovin

7 Délka dobré funkce kloubní náhrady kyčle nejvíce závisí na:

- a) kvalitě materiálu, ze kterého je protéza vyrobena
- b) přesnosti implantace komponent do kosti
- c) třecím povrchu implantátu
- d) váze pacienta

8 Kontraindikací operace TEP kyčle je:

- a) cukrovka
- b) věk méně než 30 let
- c) infekční onemocnění, fokální infekce
- d) hypertenze

9 Rizikovým pohybem pro přední luxaci TEP kyčle je:

- a) zevní rotace končetiny
- b) hluboký sed
- c) abdukce v kyčli
- d) chůze po schodech

10 Primární hyperaldosteronismus:

- a) patří mezi častější formy endokrinně podmíněné hypertenze
- b) se většinou manifestuje jako těžká arteriální hypertenze
- c) je nejčastěji na podkladě aldosteron produkujícího adenomu
- d) bývá provázen laboratorním nálezem hypokalémie a metabolické alkalózy

11 Při léčbě spironolaktonem je nutné:

- a) pravidelně kontrolovat mineralogram a renální funkce
- b) sledovat odpověď krevního tlaku na léčbu
- c) monitorovat hladiny spironolaktonu v séru
- d) pravidelně vyšetřovat zrakovou ostrost

12 K nežádoucím účinkům spironolaktonu patří:

- a) poruchy menstruačního cyklu
- b) rozvoj bolestivé gynekomastie u mužů
- c) pruritus
- d) galaktorea

Správně odpovědi: 1. b 2. d 3. c 4. b 5. a, c 6. b, c 7. b 8. c 9. a 10. a, b, d 11. a, b 12. a, b