

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Vyberte vhodné alternativy léčby bolesti pro pacienty s počínající osteoartrózou (intermitentní námaňová bolest, bez příznaků zánětu)

- a) paracetamol podle potřeby
- b) paracetamol podle potřeby, při neúčinnosti event. malé dávky ibuprofenu podle potřeby
- c) ibuprofen 3 × 400 mg kontinuálně
- d) glukosamin sulfát a ibuprofen 3 × 400 mg denně kontinuálně

2 Vyberte vhodné alternativy léčby bolesti pro pacienty s osteoartrózou a zvýšeným gastrointestinálním rizikem:

- a) diklofenak parenterálně, event. v čípkové formě
- b) diklofenak v kombinaci s omeprazolem
- c) celekoxib denně
- d) paracetamol a tramadol

3 Hlavními léky akutního záchvatu migrény jsou:

- a) antagonisté dopaminergních receptorů
- b) antagonisté gama-aminomáselné kyseliny
- c) agonisté serotoninových receptorů
- d) agonisté noradrenergických receptorů

4 V léčbě tenzních bolestí hlavy nejsou vhodná:

- a) nesteroidní antirevmatika
- b) kombinovaná analgetika a opiáty
- c) opioidy
- d) monokomponentní analgetika

5 Umělá výživa v paliativní péči

- a) je podávána vždy
- b) je podávána při současné jiné léčbě
- c) je základní součástí péče o umírající
- d) v paliativní péči se vůbec nepoužívá

6 Enterální výživu v paliativní péči používáme

- a) je-li perorální příjem nedostatečný
- b) pokud lze využít zažívací trakt
- c) chceme-li pacientovi prodloužit život
- d) pro prevenci komplikací z podvýživy a zlepšení kvality života

7 Imunoprofylaxe vakcínami Lupidon stimuluje

- a) buněčnou imunitu
- b) humorální imunitu
- c) výhradně nespecifickou imunitu
- d) žádná odpověď není správná

8 Imunoprofylaxe vakcínami Lupidon je určena

- a) k prevenci herpes-simplex nákaz
- b) k prevenci rekurentních herpes-simplex nákaz
- c) k léčbě rekurentních herpes-simplex nákaz
- d) žádná odpověď není správná

9 Mezi klasické příznaky způsobené BHP nepatří:

- a) nykturie
- b) urgence
- c) bolestivé močení
- d) oslabený proud moči

10 Urodynamická vyšetření slouží u pacientů s BHP k posouzení:

- a) LUTS
- b) BOO
- c) BPE
- d) rizika vzniku karcinomu prostaty

11 V jakém případě si může diabetik odpojit inzulinovou pumpu?

- a) při hyperglykemii
- b) při nákupu v supermarketu
- c) při sportu
- d) při onemocnění zažívacího traktu

12 Co je selfmonitoring:

- a) pravidelná kontrola glykémie
- b) kontrola zásob kanyl a zásobníků
- c) podávání bonusu k jídlu
- d) zkroucení kanyly při zavádění

1. a, b; 2. b, c, d; 3. c; 4. b; 5. b; 6. a, b, d; 7. a; 8. b; 9. c; 10. b; 11. c; 12. a