

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Zlatý stafylokok na kůži u atopické dermatitidy:

- a) je neškodným symbiontem
- b) vede k většímu pruritu a chronicitě atopické dermatitidy
- c) nemá vliv na snížení účinnosti lokálních kortikoidů
- d) je přítomen u většiny pacientů

2 Lokální kortikosteroidy u atopické dermatitidy:

- a) začíná se vždy slabším a při malém efektu se přechází na silnější
- b) se smí používat pouze slabé či středně silné
- c) výběr síly se individuálně řídí dle závažnosti, věku a lokalizace
- d) raději slabší po delší dobu než silnější po krátkou dobu

3 Emolienca jsou u atopické dermatitidy vhodná:

- a) vždy
- b) jen u suché kůže
- c) jen v zimě
- d) jen po zahojení akutního zánětu

4 Jako probiotika označujeme:

- a) živé mikroorganismy příznivě ovlivňující zdravotní stav člověka
- b) vlákninu
- c) substrát k výživě přátelských bakterií
- d) kombinaci substrátu s bakteriemi

5 Diabetes mellitus 2. typu:

- a) není spojen se systémovým zánětem
- b) může být vyvolán vysokotukovou dietou
- c) probiotika neovlivní jeho vznik a vývoj
- d) nevyskytuje se společně s obezitou, hypertenzí a s dyslipidemií

6 Základní odlišnost v péči o diabetika na rozdíl od jiných chronicky nemocných spočívá v:

- a) nutnosti většinou trvalé medikace
- b) péče se neliší
- c) spočívá v pravidelném měření krevního tlaku
- d) nutnosti kontinuální a individuální edukace

7 Mezi základní zásady edukace nepatří:

- a) srozumitelnost
- b) individuální přístup
- c) rekondiční kurzy
- d) ověření a upevnění znalostí

8 Metabolický syndrom jako soubor příznaků:

- a) může být samostatně použit jako prediktor KV rizika
- b) může být použit samostatně jako prediktor rizika renálního poškození
- c) lze použít pouze samostatně jednotlivé faktory
- d) platí pouze u mužů

9 Sérová hladina asymetrického dimethylargininu je ve srovnání se zdravou populací:

- a) zvýšena u nemocných s obezitou
- b) snížena u nemocných po úspěšné transplantaci
- c) zvýšena jak u snížené renální funkce, tak po transplantaci
- d) jeho metabolismus není ovlivněn renální funkcí

10 Vzorec protilátek proti EBV: VCA IgG+++, VCA IgM++, EBNA IgG- je charakteristický:

- a) pro latenci
- b) pro reaktivaci infekce
- c) pro primární infekci
- d) všechny odpovědi jsou správné

11 Pro sérologickou diagnostiku neuroinfekcí je významné:

- a) stanovení protilátek v séru
- b) stanovení intratekálních protilátek pomocí vyšetření párového vzorku séra a likvoru
- c) stanovení protilátek v likvoru
- d) ani jedna z odpovědí není správná

12 Pro průkaz aktivní cytomegalovirové infekce u imunodeficientního pacienta pomocí PCR je vhodné odebrat:

- a) moč
- b) nesrážlivou krev
- c) výtěr z nosohltanu
- d) všechny odpovědi jsou správné

Odpovědi: 1. b, d; 2. c; 3. a; 4. a; 5. b; 6. d; 7. c; 8. c; 9. a, c; 10. c; 11. b; 12. b