

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Které z uvedených stavů mohou napodobovat klinické projevy při BPH a stávají se tak důležitými z hlediska diferenciální diagnostiky?

- a) striktura uretry či stenóza uretry
- b) adenokarcinom prostaty
- c) nádory a traumata v oblasti malé pánve, míchy a mozku
- d) prostatolitiazis

2 Které z následujících léků patří mezi blokátory alfa 1 adrenergních receptorů používaných při BPH?

- a) doxazosin
- b) tamsulosin
- c) finasterid
- d) pygeum africanum

3 Pro techniku HRCT plic jsou typické:

- a) nízké prostorové rozlišení, šířka řezu 1 mm a méně, ostrý rekonstrukční algoritmus
- b) vysoké prostorové rozlišení, šířka řezu nad 1 mm, ostrý rekonstrukční algoritmus
- c) vysoké prostorové rozlišení, šířka řezu 1 mm a méně, ostrý rekonstrukční algoritmus
- d) nízké prostorové rozlišení, šířka řezu 1 mm a méně, měkký rekonstrukční algoritmus

4 HRCT plic je dnes významnou složkou vyšetřovacího algoritmu (nejvýstižnější odpověď):

- a) ložiskových plicních procesů
- b) difúzních pneumopatií
- c) intersticiálních procesů plicních
- d) intersticiálních plicních zánětů

5 Diagnostika ulcus cruris venosum je založena na:

- a) zhodnocení anamnestických údajů a klinickém vyšetření, duplexní ultrazvukové vyšetření žilního a tepenného systému není nutné
- b) zhodnocení anamnestických údajů, klinického vyšetření, základních laboratorních vyšetření a duplexním ultrazvukovým vyšetření žilního a tepenného systému
- c) zhodnocení anamnestických údajů, klinického vyšetření, základních laboratorních vyšetření. Duplexní ultrazvukové vyšetření indikujeme, pokud se ulcerace do 3 měsíců nezhojí
- d) typickém klinickém obrazu, další vyšetření nejsou nutná

6 Ulcus cruris venosum:

- a) důsledně chráníme před kontaktem s vodou
- b) při převazu sprchujeme vodou o nízké teplotě (< 28 stupňů)
- c) pacienta neomezuje v koupání ve vaně či bazénu
- d) při převazu sprchujeme vodou o teplotě kolem 28 stupňů

7 Pacient má výraznou závrat při vstávání a při otočení z boku na bok. Jde o:

- a) Menierovu chorobu
- b) neurinom statoakustiku
- c) BPPV
- d) žádná z odpovědí není správná

8 Pacientka pozoruje zvolna se vyvíjející jednostrannou poruchu sluchu a mírný tinnitus. Jde o:

- a) neuronitis vestibularis
- b) neurinom statoakustiku
- c) herpes zoster oticus
- d) BPPV

9 Anurického pacienta akutně ohrožuje na životě:

- a) plicní edém
- b) stenóza AVF
- c) hyperfosfatemie
- d) arytmie z hyperkalemie

10 Výhoda peritoneální dialýzy:

- a) intermitentní metoda
- b) kontinuální metoda
- c) déle zachována reziduální funkce ledvin
- d) nutnost použití antikoagulace

11 Diabetická proximální neuropatie:

- a) vzniká vždy po řadě let trvání nekompenzovaného diabetu mellitu
- b) může být i prvním projevem diabetu mellitu
- c) je nejčastější formou diabetické neuropatie
- d) může být symetrická

12 Pro terapii diabetické neuropatie je nejdůležitější:

- a) včasné podání intravenózních imunoglobulinů
- b) pravidelné podávání vitaminů skupiny B
- c) správná a časná kompenzace diabetu
- d) včasné zahájení terapie kyselinou alfa-lipoovou

Správné odpovědi: 1. a, b, c; 2. a, b, c; 3. c; 4. b; 5. b; 6. d; 7. c; 8. b; 9. a, d; 10. b, c; 11. b; 12. c