

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Kolik nemocných s gastrointestinálními projevy nebo komplikacemi nemá varovné znaky a příznaky?

- a) více jak 50 %
- b) více jak 90 %
- c) méně jak 10 %
- d) méně jak 20 %

2 Preventivní opatření proti krvácení vyžaduje nekombinovat NSA s:

- a) antikoagulancii
- b) nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové
- c) inhibitory protonové pumpy
- d) antagonisty H2 receptorů

3 Nejčastěji způsobují vedlejší příhody v trávicím traktu:

- a) antibiotika
- b) NSA
- c) myorelaxancia
- d) antitusika

4 Diagnózu jícnového polékového poškození i při poměrně jasné symptomatologii potvrdí:

- a) endoskopie
- b) histologie
- c) imunohistochemie
- d) serologie

5 Močová inkontinence je:

- a) jakýkoliv dobrovolný únik moči
- b) jakýkoliv nedobrovolný únik moči
- c) únik moči v noci
- d) jiný název pro enurézu

6 Mezi anticholinergika nepatří:

- a) Propiverin
- b) Tolterodin
- c) Nifedipin
- d) Solifenacin

7 Augmentační cystoplastika:

- a) je zlatým standardem v léčbě urgentní inkontinence
- b) je miniinvasivním výkonem pro stresovou inkontinenci
- c) nepatří do léčby urgentní inkontinence
- d) využívá střevní segment k zvětšení kapacity močového měchýře

8 Diagnostickou metodou první volby při podezření na hlubokou žilní trombózu je:

- a) kontrastní venografie
- b) vyšetření D-dimerů
- c) duplexní sonografie
- d) žádná z možností není správná

9 V těhotenství se v léčbě hluboké žilní trombózy používá:

- a) warfarin a komprese DK
- b) heparin (nefrakcionovaný nebo LMWH) a komprese DK
- c) anopyrin a komprese DK
- d) žádná z možností není správná

10 Komprese se v léčbě hluboké žilní trombózy:

- a) používá vždy, je základem léčby
- b) používá v kombinaci s LMWH pouze u chodících pacientů
- c) používá první 3 měsíce léčby
- d) žádná z možností není správná

11 Pokud při vyšetření DK s podezřením na hlubokou žilní trombózu nelze provést kompletní sonografii žil a výsledek je v daném rozsahu negativní:

- a) odešleme pacienta k vyšetření kontrastní venografií
- b) pozveme si nemocného během 4–7 dnů ke kontrolní sonografii (kromě pac. s vysokým rizikem TEN)
- c) opíráme se o výsledek vyšetření D-dimerů
- d) všechny uvedené možnosti jsou správné

12 Chronohypnotika působí hypnoticky na základě:

- a) ovlivnění doby začátku a konce spánkového procesu
- b) snížení amplitudy cirkadiálního rytmu
- c) působení na časování fází spánku a bdění
- d) zkrácení latence usnutí

13 Chronobiotika způsobují:

- a) synchronizaci cirkadiálních rytmů a molekulárních hodinových genů
- b) zvýšení spánkového tlaku v kteroukoli denní dobu
- c) posun fáze spánku vpřed nebo vzad
- d) nezávislost na synchronizátorech biologických rytmů

14 Farmakodynamická léková interakce spočívá:

- a) v synergii efektu léků na cílových receptorech
- b) v antagonismu efektu léků na cílových receptorech
- c) ve zvýšeném metabolismu léků na úrovni cytochromu P450
- d) ve snížení citlivosti cílových receptorů xenobiotik

15 Farmakokinetická léková interakce způsobuje změny koncentrace nevázaného léčiva působícího na tkáň na úrovni jeho:

- a) absorpce
- b) distribuce
- c) metabolismu
- d) vylučování

16 K diagnostice nekomplikované vulvovaginální kandidózy je nezbytné:

- a) mikroskopické vyšetření poševního nátěru
- b) mykologická kultivace materiálu z pochvy
- c) amin-test s detekcí biogenních aminů
- d) zjištění citlivosti na antimykotika

17 Při léčbě nekomplikované vulvovaginální kandidózy je třeba:

- a) preferovat lokální podání antimykotika
- b) vždy přeléčit sexuální partnery
- c) podávat antimykotika jenom dle výsledků zjištěné citlivosti
- d) volit způsob léčby dle subjektivního názoru lékaře

18 V prevenci vulvovaginální kandidózy se mimo jiné uplatňuje:

- a) pohlavní styk s kondomem
- b) omezené nošení punčocháčů
- c) pravidelné užívání mýdla v hygieně genitálu
- d) specifická perorální vakcína

19 Indikací k artroskopii kyčelního kloubu je:

- a) pokročilé stadium artrózy
- b) poškození labra
- c) poranění kloubní chrupavky
- d) infekce kolemkloubních měkkých tkání

20 Kontraindikací artroskopie kyčelního kloubu je:

- a) špatná kvalita kosti – těžká osteoporóza
- b) obezita
- c) volná nitrokloubní tělíska
- d) onemocnění synoviální výstelky

Správné odpovědi: 1. a; 2. a, b; 3. a, b; 4. a; 5. b; 6. c; 7. d; 8. c; 9. b; 10. a; 11. b; 12. b; 13. c; 14. a, b; 15. a, b, c, d; 16. a; 17. d; 18. b, d; 19. b, c; 20. a, b