

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Mezi objektivní metody vyšetření sluchu patří:

- a) vyšetření otoakustických emisí
- b) tónová audiometrie
- c) vyšetření sluchu řečí
- d) tympanometrie

2 Příčinou převodní nedoslýchavosti může být:

- a) ototoxické poškození vnitřního ucha
- b) traumatická perforace bubínku
- c) akutní nebo chronický zánět středouší
- d) nádor v oblasti mostomozečkového koutu

3 Vazovagální synkopa vzniká při:

- a) nekonvulzivní formě epileptického záchvatu
- b) dlouhém stání, rozrušení, při podráždění sympatiku
- c) poruchách srdečního rytmu
- d) metabolických příčinách poruchy vědomí

4 Pacienta po přechodné ztrátě vědomí můžeme ponechat na místě, když:

- a) měl projevy ischemické choroby srdeční před více než pěti lety
- b) neurologický ložiskový nález je pouze přechodný a jedná se jen o tranzitorní mozkovou ischemii
- c) se jedná o mladého nemocného s typickou vazovagální synkopou a s nepřítomností všech rizikových faktorů
- d) je příčina kolapsu nebo synkopy nejasná

5 Hodnota GCS (Glasgowské škály) u pacienta, který je bledý, otevře oči na oslovení, má amnezii, výzvě vyhoví s latencí, je:

- a) 8
- b) 3
- c) 13
- d) 10

6 Rizikovým faktorem ED je:

- a) abúzus alkoholu, kouření
- b) hypertenze
- c) obezita, nízká pohybová aktivita
- d) všechny odpovědi jsou správné

7 Poruchy erekce mohou vyvolat následující psychofarmaka:

- a) SSRI
- b) inhibitory MAO
- c) trazodon
- d) bupropion

8 Mezi základní diagnostická vyšetření ED nepatří:

- a) vyšetření glykemie
- b) vyšetření lipidového spektra
- c) vyšetření PSA
- d) falopletyzmografie

9 Zásady racionální farmakoterapie periferní neuropatie jsou:

- a) co nejnižší dávka léku
- b) postupné titrování na účinnou dávku
- c) na začátku léčby ihned kombinace léčiv
- d) při neúspěchu monoterapie je možná kombinace

10 Co je nejčastější příčinou periferní neuropatie?

- a) diabetes mellitus
- b) chronická renální insuficience
- c) profesní intoxikace
- d) renální selhání

11 Které příznaky se manifestují nejdříve?

- a) poruchy autonomních funkcí
- b) parestezie a dysestezie na akrech končetin
- c) celková slabost a nevykonnost
- d) porucha zrakové ostrosti

12 Elektromyografie (EMG) je metoda určená pro:

- a) vyšetření cévního systému
- b) stimulaci periferních nervů
- c) určení stupně svalové síly na končetinách
- d) vyšetření periferních nervů, svalů a nervosvalového přenosu

13 Maximální dávka kolchicinu pro léčbu dnaveho záchvatu během prvních 24 hodin je:

- a) 6 mg
- b) 4 mg
- c) 16 mg
- d) 2 mg

14 Rozhodující kritéria pro indikaci biologické léčby u revmatoidní artritidy jsou:

- a) rentgenové stadium onemocnění
- b) stáří pacienta
- c) aktivita onemocnění
- d) aktivita onemocnění a selhávání konvenční léčby

15 Cílové hodnoty glykovaného Hb mají být u pacientů s diabetickou nefropatií a renální insuficiencí:

- a) nižší než u diabetiků bez nefropatie
- b) stejné jako u diabetiků bez nefropatie, dosažení dobré metabolické kontroly je u pacientů s chronickou renální insuficiencí vzhledem k snížené degradaci inzulinu v ledvinách výrazně snadnější
- c) stejné jako u diabetiků bez nefropatie, u pacientů s renální insuficiencí ale může být vyšší riziko nežádoucích účinků, např. hypoglykemií
- d) nižší ve stadiu 3 a vyšší ve stadiu 4

16 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo antagonisté angiotenzinu:

- a) jsou indikovány u všech pacientů s diabetem a mikroalbuminurií nebo proteinurií
- b) jsou kontraindikovány u pacientů s pokročilou renální insuficiencí
- c) musí být u pacientů s chronickou renální insuficiencí vždy kombinovány s diuretiky
- d) musí být u pacientů s chronickou renální insuficiencí vždy kombinovány se spironolaktonem

17 U diabetiků s chronickou renální insuficiencí:

- a) jsou kontraindikovány statiny
- b) zásadně podáváme statiny v kombinaci s fibráty
- c) může být výhodné podávat nižší dávku statinů s inhibitory střevní absorpce cholesterolu ezetimibem
- d) jsou u hypercholesterolemie lékem volby fibráty

18 Typický nález při rentgenovém vyšetření u chodrokalcinózy je:

- a) kalcifikace kloubních chrupavek
- b) destruktivní změny obvykle se sklerotickým okrajem
- c) kalcifikace periartikulárních tkání
- d) osteoproduktivní změny

19 Nejčastější lokalizací manifestace dnové artritidy je:

- a) kyčelní kloub
- b) klouby rukou
- c) klouby nohy
- d) rameno

20 Typický nález při rentgenovém vyšetření u dny je:

- a) kalcifikace kloubních chrupavek
- b) destruktivní změny obvykle se sklerotickým okrajem
- c) kalcifikace periartikulárních tkání
- d) osteoproduktivní změny

Správné odpovědi: 1. a, d; 2. b, c; 3. b; 4. c; 5. c; 6. d; 7. a, b; 8. d; 9. b, d; 10. a; 11. b; 12. d; 13. a; 14. d; 15. c; 16. a; 17. c; 18. a; 19. c; 20. b