

Unikátní řešení na běžné nachlazení ověřené novou studií¹

Při včasném podávání Soledum[®]
(do 12 h od výskytu prvních symptomů)

- **Zkracuje dobu nemoci¹**
(téměř o 2 dny)
- **Zmírňuje symptomy¹**

Prokázané účinky:



Protizánětlivý²
Srovnatelný s 3,75 mg prednisolonu.



Nepřímý antivirový³



Expektorační²
Snižuje nadměrnou produkci hlenu a usnadňuje jeho vykašlávání díky zvýšení mukociliárního transportu.



Spasmolytický²




Antioxidační²

Snadné dávkování:

- 3x denně 1 tobolka (akutní léčba)
- 2x denně 1 tobolka (dlouhodobá léčba)

Ideálně mezi jídlem nebo před ním.



**Soledum[®] je vhodné
k symptomatické
a podpůrné léčbě:**

- Běžného nachlazení
- Vlhkého kašle
- Akutní sinusitidy
- Akutní bronchitidy
- Chronické sinusitidy
- Chronické bronchitidy
- Bronchiálního astmatu
- CHOPN



1. The effect of early administered cineole on the course of a common cold, EudraCT 2020-000860-51, publikace v přípravě. 2. SPC Soledum[®] 200 mg enterosolventní měkké tobolky. 3. Müller J, Greiner J, Zeuner M *et al.* 1,8-Cineole Potentiates IRF3-mediated Antiviral Response in Human Stem Cells and in an Ex Vivo Model of Rhinosinusitis. Clin Sci (Lond). 2016; 130(15): 1339-1352.

Soledum[®] 200 mg enterosolventní měkké tobolky: S: cineolum 200 mg v jedné měkké enterosolventní tobolce. IS: Expectorans. Cineol působí protizánětlivě, mírně spasmolyticky a má sekretomotorické účinky. I: Soledum[®] 200 mg enterosolventní měkké tobolky - symptomatická léčba běžného nachlazení, akutní sinusitidy a bronchitidy, přídatná léčba CHOPN u dospělých a dětí starších 12 let. D: Soledum[®] 200 mg enterosolventní měkké tobolky: dospělí a děti od 12 let užívají 1 tobolku 3x denně, u dlouhodobé léčby je obvykle dostatečná dávka 2x 1 tobolka denně. IT: V pokusech na zvířatech cineol indukoval metabolizující enzymy v játrech, u lidí nebylo při správném používání cineolu zaznamenáno. NU: Gastrointestinální - méně časté: nauzea, průjem, vzácné: dysfagie. Imunitní systém - vzácné: hypersenzitivní reakce - otok obličeje, svědění, respirační tíseň. ZÚ: v případě přecitlivělosti dýchacích cest a u pacientů s bronchiálním astmatem užívat pod dohledem lékaře. Nevhodné pro pacienty s intolerancí fruktózy. TL: užívání u těhotných pouze po pečlivém vyhodnocení poměru rizika a přínosu. Kojící - silice mohou ovlivnit chuť mateřského mléka a vyvolat problémy při kojení. B: 20 měkkých enterosolventních tobolek. Cassella-med GmbH & Co. KG Gereonsmühlengasse 1 50670 Kolín nad Rýnem, Německo. Datum poslední revize textu SPC: Soledum[®] 200 mg enterosolventní měkké tobolky 2. 11. 2020. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se, prosím, se s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC).