

menat, že bakterie skutečně produkuje toxin. Je vždy nezbytné doplnit diagnostiku o testy potvrzující samotnou produkci toxinu (1).

Z hlediska terapeutického managementu platí, že pacient přestává být infekční 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. To však neznamená, že by léčba mohla být předčasně ukončena. Pro minimalizaci rizika relapsu a dalšího přenosu infekce je nutné dodržet kompletní délku antibiotické terapie a zároveň respektovat

vat izolační opatření až do získání dvou po sobě negativních kontrolních sěrů (1).

Závěr

Difterie se opět vyskytuje v ČR v narůstajícím trendu a v různě závažných formách. Existují toxigenní a netoxigenní kmeny s možností způsobit systémové komplikace, a to i při zdánlivě banální kožní formě onemocnění. Záškrt je vysoce infekční nákaza, šíří se kapén-

kami i kontaktem s kožními lézemi. V prostředí s horší hygienou, jako jsou například azylové domy a věznice, se může šířit rychle. Očkování chrání před onemocněním, ale nebrání nosičství. Důležité je včasné nasazení antibiotik a u toxigenních kmenů i aplikace difterického antitoxinu. Pacienti musí být izolováni, aby se zabránilo šíření infekce. Je důležité vyhledávání kontaktů a monitoring, aby se předešlo dalšímu šíření.

LITERATURA

1. Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrt (difterii) v. 01 (leden 2023). Příloha k č. j. MZDR 1668/2023-1/OVZ [Internet]. Available from: <https://infekologie.cz/standarty/DP-difterie-01-2023.pdf>.

2. World Health Organization. Diphtheria [Internet]. Geneva: WHO; [cited 2025 Mar 26]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diphtheria>.

3. Papoušková A. Difterie – zoonóza 21. století? KMIL. Jul 2024;30(2):42-45.

4. Beneš J. Infekční lékařství. Záškrt a jiné infekce vyvolané *Corynebacterium diphtherium*. Praha: Galén; 2009.

ON-LINE KURZ

3 maligní komplikace hypertenze

OBSAH KURZU

- ▶ Poruchy rytmu jako důsledek arteriální hypertenze
prof. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
- ▶ Arteriální hypertenze a ICHS aneb když je srdce pod tlakem
prof. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
- ▶ Hypertenze a srdeční selhání – prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
- ▶ Tři maligní komplikace hypertenze (studijní materiál)

ODBORNÝ GARANT:

prof. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

POŘADATEL:

Společnost SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s II. interní klinikou – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

POČET
KREDITŮ **2**

Registrace
ZDARMA

TERMÍN
duben 2025
až březen 2026
dostupný na
online.solen.cz

